



# ຂໍ້ມູນການປຸກຈິດສໍານຶກຂອງຕົນເອງກ່ຽວກັບເຕົ້ານົມ

## 1. ຮູ້ຈັກຄວາມສ່ຽງຂອງທ່ານ

- ສິນທະນາກັບສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບປະຫວັດສຸຂະພາບຂອງຄອບຄົວທ່ານ
- ສິນທະນາກັບແພດໝູ່ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຂອງທ່ານຕໍ່ການເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມ

## 2. ທຳການກວດ

- ຂໍຄໍາປຶກສາຈາກແພດໝູ່ກ່ຽວກັບວິທີການກວດທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບທ່ານ ຖາຫາກທ່ານມີຄວາມສ່ຽງສູງ
- ເຮັດແມມມໍແກຣມ (mammogram) ເປັນປະຈຳທຸກໆປີ ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ອາຍຸ 40 ປີ ຖາຫາກທ່ານມີຄວາມສ່ຽງໃນລະດັບປານກາງ
- ກວດເຕົ້ານົມ ໂດຍແພດໝູ່ເປັນປະຈຳຢ່າງຕໍ່າທຸກໆ 3 ປີ ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ອາຍຸ 25 ປີ ແລະ ເປັນປະຈຳທຸກໆປີ ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ອາຍຸ 40 ປີ

## 3. ຮູ້ຈັກສິ່ງທີ່ປົກກະຕິສໍາລັບທ່ານ

- ຄວນໄປພົບແພດ ຖາຫາກທ່ານສັງເກດເຫັນການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ຂອງເຕົ້ານົມ:
  - ມີກ້ອນເນື້ອ, ເປັນກ້ອນແຂງ ຫຼື ໜາ ຢູ່ໃຕ້ບໍລິເວນເຕົ້ານົມ ຫຼື ໃຕ້ວົງແຂນ
  - ໄຄ່ບວມ, ອຸ່ນ, ແດງ ຫຼື ເຕົ້ານົມມີສີຄໍາລົງ
  - ມີການປ່ຽນແປງໃນດ້ານຂະໜາດ ແລະ ຮູບຮ່າງ ຂອງເຕົ້ານົມ
  - ຜິວໜັງເປັນຮູຫູບລົງ ຫຼື ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນກັບເປືອກໝາກກ່ຽງ
  - ມີອາການຄັນ, ມີຕຸ່ມເປັນເກັດ, ຫຼື ຜິ່ນ ຢູ່ເທິງຫົວນົມ
  - ຫົວນົມ ຫຼື ພາກສ່ວນອື່ນໆຂອງເຕົ້ານົມ ຖືກດຶງເຂົ້າດ້ານໃນ
  - ຫົວນົມມີການຫຼັ່ງນໍ້າໜອງອອກມາ
  - ມີອາການເຈັບປວດໃໝ່ໃນຈຸດໜຶ່ງ ທີ່ບໍ່ຫາຍໄປ

## 4. ສ້າງທາງເລືອກການດຳລົງຊີວິດທີ່ດີທີ່ສຸຂະພາບ

- ຮັກສານໍ້າໜັກໂຕໃຫ້ຢູ່ໃນເກນທີ່ດີທີ່ສຸຂະພາບ
- ເພີ່ມການອອກກຳລັງກາຍເຂົ້າໃນກິດຈະວັດປະຈຳວັນຂອງທ່ານ
- ຈຳກັດການດື່ມສຸລາ
- ຈຳກັດການນຳໃຊ້ຮໍໂມນໄວໝົດປະຈຳເດືອນ
- ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ໃຫ້ທ່ານລຽງລຸກດ້ວຍນົມແມ່

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ເຂົ້າໄປໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ ຫຼື ໂທຫາສາຍດວນມະເຮັງເຕົ້ານົມ

# ຮູ້ຈັກສິ່ງທີ່ປົກກະຕິສໍາລັບທ່ານ


ອາການສະແດງຂອງມະເຮັງເຕົ້ານົມຈະບໍ່ຄືກັນສໍາລັບແມ່ຍິງແຕ່ລະຄົນ ເພາະສະນັ້ນ, ມັນຈຶ່ງເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຕ້ອງຮູ້ຈັກວ່າປົກກະຕິແລ້ວ ເຕົ້ານົມຂອງທ່ານມີລັກສະນະ ແລະ ຮູສີກໍແນວໃດ. ຖາທາກທ່ານສັງເກດເຫັນການປ່ຽນແປງ ໃຫ້ໄປພົບແພດທັນທີ.

## ການປ່ຽນແປງທີ່ຄວນຖືກລາຍງານ ລວມມີ:

- ມີກ້ອນເນື້ອ, ເປັນກ້ອນແຂງ ຫຼື ໜາ ຢູ່ໃຕ້ບໍລິເວນເຕົ້ານົມ ຫຼື ໃຕ້ວົງແຂນວົງແຂນ



- ໂຄ່ບວມ, ອຸ່ນ, ແດງ ຫຼື ເຕົ້ານົມມີສີຄໍາລົງ



- ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານຂະໜາດ ແລະ ຮູບຮ່າງ ຂອງເຕົ້ານົມ ມີການປ່ຽນແປງທາງດ້ານຂະໜາດ ແລະ ຮູບຮ່າງ ຂອງເຕົ້ານົມ



- ຜິວໜັງເປັນຮູຫຸບລົງ ຫຼື ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນກັບເປືອກໝາກກຸ່ງ



- ມີອາການຄັນ, ມີຕຸ່ມເປັນເກັດ, ຫຼື ຜິ່ນ ຢູ່ເທິງຫົວນົມ



- ຫົວນົມ ຫຼື ພາກສ່ວນອື່ນໆຂອງເຕົ້ານົມ ຖືກດຶງເຂົ້າດ້ານໃນ້ານໃນ



- ຫົວນົມມີການຫຼັ່ງນໍ້າໜອງອອກມາ ທັນທີທັນໃດ



- ມີອາການເຈັບປວດໃໝ່ໃນຈຸດໜຶ່ງທີ່ບໍ່ຫາຍໄປ

