

DIFERENCIAS RACIALES Y ÉTNICAS en el cáncer de mama en los EE. UU.

El cáncer de mama es el cáncer más común en las mujeres. Entre las mujeres en los EE.UU., las tasas de incidencia (nuevos casos) de cáncer de mama y mortalidad (muertes) difieren según la raza y el origen étnico.

Mujeres negras* en los EE. UU.

En general, la tasa de cáncer de mama en mujeres negras es ligeramente menor que en mujeres blancas. Sin embargo, en mujeres menores de 40 años, la tasa de nuevos casos es mayor en mujeres negras que en mujeres blancas. Se están estudiando las razones por las cuales esto ocurre.

El cáncer de mama es la segunda causa principal de muerte por cáncer en mujeres negras. La tasa de mortalidad por cáncer de mama en mujeres negras es aproximadamente 40 por ciento más alta que en mujeres blancas. Esto puede deberse a:

- Diferencias en los tumores (más probabilidades de tener cáncer de mama triple negativo).
- Etapa avanzada del cáncer de mama al momento del diagnóstico.
- Barreras de acceso a asistencia de alta calidad (como no tener seguro médico).
- Factores de riesgo (como el sobrepeso o la obesidad).
- Conductas de salud (como no terminar el tratamiento).

Mujeres hispanas y latinas en los EE. UU.

El índice y la tasa de mortalidad del cáncer de mama son menores en mujeres hispanas y latinas que en mujeres blancas y negras. Sin embargo, el cáncer de mama es el cáncer más común y la principal causa de muerte por cáncer en mujeres hispanas y latinas.

Las mujeres hispanas y latinas tienden a ser diagnosticadas con cánceres de mama en etapas más avanzadas que las mujeres blancas. Esto puede deberse a retrasos en el seguimiento después de una mamografía anormal.

Además, es posible que las mujeres hispanas y latinas tengan menos probabilidades que las mujeres blancas de recibir asistencia oportuna y de alta calidad para el cáncer de mama.

Índice y mortalidad del cáncer de mama en mujeres de EE.UU. por raza y origen étnico, 2015-2019



©Fuente: SEER Cancer Statistics Review, 2000-2020, 2022

Términos:

El índice muestra el número de **casos** de cáncer de seno en una población de tamaño dado.

La mortalidad muestra el número de **muertes** por cáncer de seno en una población de tamaño dado.

No se sabe si esto afecta la sobrevivencia del cáncer de mama en mujeres hispanas y latinas.

Mujeres asiático-estadounidenses y de las islas del Pacífico en los EE. UU.

El índice y la tasa de mortalidad del cáncer de mama son menores en mujeres asiático-estadounidenses y de las islas del Pacífico que en mujeres blancas y negras.

Las tasas varían entre los grupos étnicos asiático-estadounidenses. Por ejemplo, la tasa de nuevos casos de cáncer de mama es mayor en mujeres estadounidenses de Samoa y Hawái que en mujeres estadounidenses de origen chino y vietnamita.

El cáncer de mama es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres asiático-estadounidenses.

Esta hoja informativa es solo una breve perspectiva general. Para obtener más información, visite [komen.org](https://www.komen.org) o bien, llame a la línea de ayuda de Komen para el cuidado de las mamas al 1-877-465-6636 (1-877 GO KOMEN) de lunes a viernes de 9 a.m. a 10 p.m., hora del este, o envíe un correo electrónico a helpline@komen.org. Se habla español.

***Nota:** En este recurso, el término "negro" se usa como un término que incluye a personas que se identifican como negros, afroamericanos, multiculturales, o inmigrantes nuevos o recientes.

DIFERENCIAS RACIALES Y ÉTNICAS

en el cáncer de mama en los EE. UU.

Recursos

Susan G. Komen®

1-877 GO KOMEN
(1-877-465-6636)
komen.org

Intercultural Cancer Council

iccnetwork.org

Recursos relacionados en línea:

- [El cáncer de mama y el riesgo](#)
- [Exámenes de detección de cáncer de mama y pruebas de seguimiento](#)
- [Mamografía](#)

Equidad en salud:

Para promover la equidad de salud en la atención del cáncer de mama, Komen considera que todos deben tener oportunidades justas de mantener el mejor estado de salud posible independientemente de su origen cultural o demográfico. Por lo que Komen se compromete a eliminar las barreras en la atención de personas y comunidades expuestas a desigualdades de salud de las mamas actualmente y en el futuro.

Mujeres indígenas estadounidenses y nativas de Alaska en los EE. UU.

El índice y la tasa de mortalidad del cáncer de mama son menores en mujeres indígenas estadounidenses y nativas de Alaska que en mujeres blancas y negras.

Las tasas dependen del lugar en que viven. Por ejemplo, las mujeres que viven en Alaska, las llanuras del sur y las llanuras del norte tienen las tasas de cáncer de mama más altas (parecidas a las de las mujeres blancas). Las mujeres que viven en el este y el suroeste tienen las tasas más bajas.

El cáncer de mama es la segunda causa de muerte por cáncer en este grupo étnico.

¿Por qué hay diferencias en las tasas de incidencia de cáncer de mama?

Algunos grupos tienen más probabilidades que otros de presentar ciertos factores de riesgo de cáncer de mama. Esto podría explicar las razones por las cuales las tasas varían. Los factores de riesgo que varían según la raza y el origen étnico son:

- Edad a la fecha del primer parto.
- Edad a la fecha de la primera menstruación.
- Edad a la fecha del inicio de la menopausia.
- Peso corporal.
- Lactancia.
- Uso de terapia hormonal para la menopausia (hormonas posmenopáusicas).
- Número de partos.

Se están haciendo estudios para determinar otras razones.

Tasas de mamografías de detección

Las pruebas de detección se usan para detectar el cáncer de mama antes de que cause signos o síntomas de advertencia. Hacerse estas pruebas con regularidad (junto con las pruebas de seguimiento y tratamiento, si se diagnostica cáncer) reducen la probabilidad de morir de cáncer de mama.

En general, las mujeres hispanas y latinas, y blancas tienen tasas similares de mamografías de detección. Las mujeres negras tienen tasas más altas de mamografía de detección que otras mujeres. Aunque los datos son limitados, las mujeres indígenas estadounidenses y nativas de Alaska tienen tasas de mamografía de detección más bajas que otras mujeres. Las mujeres asiático-estadounidenses tienen tasas más bajas de mamografías de detección en comparación con las mujeres negras, blancas e hispanas.

Barreras para la asistencia de alta calidad de las mamas

Hay factores que pueden dificultar el acceso de algunas mujeres a las pruebas de detección del cáncer de mama o al seguimiento si la prueba de detección da un resultado anormal. Estos incluyen:

- Falta de acceso a la atención.
- Barreras económicas.
- Diferencias culturales y lingüísticas.
- Falta de conocimientos sobre el cáncer de mama.
- Injusticias raciales, étnicas y sociales.

Este contenido provisto por Susan G. Komen® está diseñado solamente con fines educativos y no es exhaustivo. Por favor consulte a su médico personal.